

JADORE

Raskenmerken

Jadore is een nieuwe hybride voor de vroege trek. Jadore is in 2006 op kleine schaal beproefd en heeft opmerkelijk goed voldaan. Er was een zeer goede waardering in de diverse LTO-Groeiservice-rassenproeven in december 2006. Jadore lijkt qua type het meest op Atlas. Lang, buikig, goed gesloten lof met een enorm produktiepotentieel. Jadore is niet extra vroeg, maar lijkt mogelijkheden te hebben tot in maart. Het lof is glanzend en de bladeren lopen door tot in de top van de krop.

Jadore is een CMS-hybride en dus uiterst uniform. Bovendien is Jadore ongevoelig voor het herbicide Safari waardoor de onkruidbestrijding nauwelijks nog problemen hoeft op te leveren.



Techniek

Zaai:

Zaai Jadore niet te vroeg, bij voorkeur na 25 mei, liefst zelfs begin juni. Het rooien vindt dan plaats rond 1 november. Het grote voordeel van later zaaien is dat het gewas vitaal de herfst in gaat met minder risico's op ziekten. Ook de natuurlijke afrijping vindt plaats in een gezond gewas. Op deze wijze is het mogelijk een afgerijpte, maar vitale pen te rooien met een sterke gezonde bladkraag.

Met betrekking tot het zaaien met een pneumatische zaaimachine adviseert Chicosem voor het zaaien van OK-precisie-zaden (gecoat of ongecoat) een gatdiameter van 0,55 -0,65 mm en voor OK-minipillen een gatdiameter van 0,9-1,0 mm.

De optimale zaaidiepte bedraagt 0,5-1,0 cm. De benodigde gemiddelde etmaaltemperatuur (=het gemiddelde van de dag- en de nachttemperatuur) voor een snelle opkomst is minimaal 12°C. Zaadhoeveelheid per ha: 280.000 tot 320.000 zaden per ha afhankelijk van teelt (zie tabel).

Plantdichtheid:

De optimale plantdichtheid ligt voor Jadore op ca. 240.000 – 250.000 planten (afhankelijk van o.a. zaaimoment, trekperiode, perceel en gewenste pendiameter). Zie ook onderstaande tabel.

Onkruidbestrijding:

Jadore is ongevoelig voor de herbicide Safari. Dit biedt grote voordelen voor de onkruidbestrijding. Safari maakt de onkruidbestrijding betrouwbaarder omdat bij Jadore zelfs in de opkomst- en kiembladfase de volle dosering gebruikt kan worden. Lees ook de documentatie betreffende het gebruik van Safari.

Rooien:

Rooien bij voorkeur rond 1 november. Laat het gewas niet te ver afrijpen en let bij het rooien op voldoende koplengte.

Bewaring:

Voor de latere trekken de witlofpennen bij voorkeur invriezen voor optimaal bewaarresultaat en trekrendement.

Trek:

Trektemperaturen zijn seizoensafhankelijk en afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In het algemeen geldt dat een jonge vitale pen in het begin van de trek meer temperatuur vraagt om de pit los te stoken en om voldoende gewicht in de basis van de krop te verkrijgen.

Bij oplopende rijpheid in januari is het van belang dat u op een vlakker schema overgaat. Voor een mooie gladde sluiting is het nodig om de eindtemperatuur op voldoende niveau te houden. Om dit te realiseren moet de starttemperatuur evenredig verlagen. Houd een relatief klein verschil aan tussen water en luchttemperatuur.

Jadore reageert zeer positief op een CaCl- behandeling. Bij gebruik over de koppen ca 50-100 g/m². in incidentele gevallen te verhogen tot 150 g/m². Het dompelen van de pennen in een CaCl-oplossing geeft nog betere resultaten.

JADORE	december	jan/feb/mrt
Zaaiperiode	mei	25 mei - 15 juni
Hoeveelheid zaden	280-320.000	300-320.000
Optimum aantal planten	220-250.000	240.000-250.000
Rooien	15 oktober – 1 november	nc 1 november
Bewaring pennen	0,0 °C.	-1 °C.