



HELIOS

Helios (OK-691) is een ras voor de trekperiode half december tot einde februari. Helios vraagt een niet te rijke bodem en levert een hoge uniforme pennenopbrengst. Helios heeft ca 150 groeidagen en de optimale rooiperiode ligt tussen 20 oktober en 15 november. Na een koelperiode van minimaal 3 weken kan men opzetten vanaf ongeveer begin december. Bij de iets latere rooiingen en een goede bewaring van de pennen is het mogelijk om Helios te forceren tot einde maart.



Glanzend en productief

Helios heeft een langer kroptype en glanzende bladeren die doorlopen tot in de punt van de krop. Het soortelijk gewicht is hoog en dit maakt Helios tot een productief ras. Helios geeft ook een goed resultaat op de fijnere pennen en geeft dan lof van hoge kwaliteit. De aanbevolen trektemperatuur is lager dan die van Darling in dezelfde periode.



TREKPERIODE	DECEMBER	JAN/FEB
Zaaiperiode *	10-25 mei	20 mei - 15 juni
Hoeveelheid zaden/ha	280-300.000	290-310.000
Optimum aantal planten/ha	250-260.000	260-280.000
Groeidagen	150	150
Rooiperiode	20 okt. - 10 nov.	1 - 20 november
Bewaring pennen	0,0 °C.	0,0 / -1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto's afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd, noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto's, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.



BINGO

Bingo (OK-3701) is in 2014 geïntroduceerd. Met Bingo bieden wij u een hoog productief ras voor de vroege trek. Bingo kan getrokken worden tot in januari. De kroppen hebben een goede sluiting met hoog doorlopende bladeren. Bingo geeft glanzende kroppen met een hoog soortelijk gewicht en is zeer productief.

Hoge wortelproductie

In de wortelteelt zien we dat Bingo gemakkelijk groeit op de pen. Bij een voldoende hoge plantdichtheid kan Bingo een hoge wortelproductie geven. De stikstofbehoefte van dit ras is gemiddeld. Bingo heeft circa 140 groeidagen in de pennenteelt.

TREKPERIODE	DECEMBER	JAN/FEB
Zaaiperiode *	5-25 mei	20 mei - 15 juni
Hoeveelheid zaden/ha	270-290.000	290-320.000
Optimum aantal planten/ha	250-260.000	260-280.000
Groeidagen	140	150
Rooiperiode	oktober	na 1 november
Bewaring pennen	0,0 °C.	0,0 / -1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

DARLING

Darling (OK-2725) is geschikt voor het vroege seizoen en kan gezaaid worden vanaf begin mei bij goede omstandigheden. Op het veld is de ongevoeligheid voor herbiciden uit de sulfonyl-urea groep een extra voordeel in de pennenteelt. Deze herbiciden maken de onkruidbestrijding betrouwbaarder omdat bij tolerante rassen zelfs in de opkomst- en kiembladfase de volle dosering toegepast kan worden. Darling vraagt een niet te hoge stikstofbemesting.

Puntig loftype met een zeer korte pit

Darling is een witlofras voor het vroege seizoen. Darling heeft een zeer korte pit en kwalitatief en puntig lof. Darling is een hybride van het type Mont Blanc. het korte zeer puntige loftype is optimaal voor de kwalitatieve markten en kleinverpakking. Door zijn korte pit is het ras gemakkelijk stuurbaar in de trek. De optimale trekperiode (oogst) is van begin november tot einde januari.

TREKPERIODE	DECEMBER	JAN/FEB
Zaaiperiode *	5-25 mei	20 mei - 15 juni
Hvh zaden/ha	270-290.000	280-310.000
Optimum aantal planten/ha	240-260.000	250-270.000
Groeidagen	140	150
Rooiperiode	oktober	na 1 november
Bewaring pennen	0,0 °C.	0,0 / -1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfsituaties en alle lokale (groei) omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfsituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto's afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd, noch bedoeld voor alle bedrijfsituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto's, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.



NACRE

Nacre (OK-8379) is bestemd voor de middenperiode vanaf februari tot in juli/augustus en misschien wel langer. Het ras toont op het veld meer groeikracht dan dat we zien bij Déesse. Nacre is ongevoelig voor herbiciden uit de sulfonyl-urea groep. Hierdoor kunnen deze herbiciden zelfs al in de kiemfase met een volle dosering behandeld worden waardoor de onkruidbestrijding betrouwbaarder wordt. Sulfonylurea herbiciden hebben een goede werking tegen onkruiden uit de groep van de composieten en de kruisbloemigen. De werking is zeer goed tegen veelvoorkomende onkruiden als kamille, knopkruid, klein kruiskruid, perzikkruid, kleefkruid, herderstasje en zwarte nachtschade.

Productief en korte pit

Nacre is het van het type Déesse maar de kroppen worden iets forser. De sluiting is prima en de bladeren zijn glanzend en goed doorlopend tot bovenin. De pit blijft relatief kort. Nacre is een productief ras met een vrij lang oogsttraject tot diep in de zomer. Met Nacre kan een groot deel van het forceerseizoen afgedekt worden.



TREKPERIODE	FEB/MRT	APR t/m JULI
Zaaiperiode *	15 mei - 10 juni	25 mei - 15 juni
Hoeveelheid zaden/ha	290-310.000	300-320.000
Optimum aantal planten/ha	250-260.000	250-270.000
Groeidagen	160	160
Rooiperiode	na 20 oktober	na 1 november
Bewaring pennen	-1 °C.	-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto's afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd, noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto's, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.



FAKIR

Het witlofras Fakir (OK-7F) is geschikt voor het midden seizoen. Dit witlofras heeft ongeveer 150-160 groeidagen maar kan onder de juiste omstandigheden (lichter grondtype en vroegere uitzaai) toch al vrij vroeg getrokken worden. Fakir levert een sterke pen met een fijne bladkraag. Fakir is optimaal trekbaar in de periode januari tot en met april.

Hét ras voor het topsegment

Het witlofras Fakir is een ware aanwinst voor het kwaliteitssegment. Dit witlof ras levert wat slanker en zeer puntig loof met een hoog doorlopend buitenblad. Dit is de ideale kropvorm voor het topsegment (kwaliteit Super en Flandria-Q). Fakir wordt in de markt dan ook gezien als het witlofras met de welhaast ideale kropvorm.

TREKPERIODE	JAN/FEB	MRT/APR/MEI
Zaaiperiode *	5-20 mei	20 mei - 10 juni
Hoeveelheid zaden/ha	270-290.000	280-310.000
Optimum aantal planten/ha	240-250.000	250-260.000
Groeidagen	160	160
Rooiperiode	na 15 oktober	ca. 1 november
Bewaring pennen	0,0 / -1 °C.	-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

DÉESSE

Witlofras Déesse (spreek uit als DS) is een nieuw ras voor het midden seizoen. Déesse (OK-8378) is een witlofras met een goede kropvorm en een korte pit. De kropen zijn glanzend, vast en puntig. De bladeren van de krop groeien goed mee tot in de punt. We zien dan ook een zeer mooi product als het geoogst is.

Zeer uniform en safari resistent

Déesse is een zeer uniforme hybride. Op het veld is de ongevoeligheid voor herbiciden uit de sulfonyl-urea groep een extra voordeel in de penneenteelt. Deze herbiciden maken de onkruidbestrijding betrouwbaarder omdat bij tolerante rassen zelfs in de opkomst- en kiembladfase de volle dosering gebruikt kan worden. Sulfonylurea herbiciden hebben een goede werking tegen probleemkruiden uit de familie van de composieten zoals kamille, knopkruid en kruiskruid, maar hebben ook een goede werking tegen een aantal andere onkruiden.

TREKPERIODE	JAN / FEB	MRT t/m JUNI
Zaaiperiode *	20 mei - 10 juni	20 mei - 15 juni
Hoeveelheid zaden/ha	280-300.000	290-310.000
Optimum aantal planten/ha	250-260.000	250-270.000
Groeidagen	160	165
Rooiperiode	na 15 oktober	na 1 november
Bewaring pennen	0,0 / -1 °C.	-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei) omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto's afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd, noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto's, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.




LADY MARIE

Lady Marie (OK-8373) is een ras voor het late segment met een goede en uniforme wortelproductie. Lady Marie vraagt 170-180 groeidagen zodat de pen voldoende reserves kan opbouwen. Dit betekent dat doorgaans niet voor 10 november gerooid zal worden. Lady Marie is ongevoelig voor herbiciden uit de sulfonyl-urea groep. Hierdoor kunnen deze herbiciden zelfs al in de kiemfase met een volle dosering toegepast worden waardoor de onkruidbestrijding betrouwbaarder wordt. Sulfonylurea herbiciden hebben een goede werking tegen onkruiden uit de groep van de composieten en de kruisbloemigen. De werking is zeer goed tegen veelvoorkomende onkruiden als kamille, knopkruid, klein kruiskruid, perzikkruid, kleefkruid, herderstasje en zwarte nachtschade.

Gemakkelijk stuurbaar

Lady Marie is een CMS hybride en daardoor zeer uniform. De optimale forceerperiode loopt van april tot einde seizoen. De glanzende kroppen zijn minder lang dan die van Vintor. Het blad loopt goed door tot bovenin en het ras kenmerkt zich door een korte pit. In de trekkerij is de gemakkelijke stuurbaarheid van dit ras een opvallend kenmerk. In vergelijking met de standaardrassen vraagt Lady Marie iets hogere trektemperaturen. Na de oogst zien we in diverse bewaarproeven een zeer goede houdbaarheid van het lof.



TREKPERIODE	MRT/APR	MEI t/m OKT
Zaaiperiode *	15-25 mei	20 mei - 5 juni
Hoeveelheid zaden/ha	280-300.000	290-310.000
Optimum aantal planten/ha	250-260.000	250-270.000
Groeidagen	170	170+
Rooiperiode	na 1 november	na 10 november
Bewaring pennen	-1 °C.	-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei) omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto's afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd, noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto's, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.



GALAXIE

Galaxie (OK-126) is een laat ras voor de trekperiode vanaf april tot einde seizoen. Deze hybride is zeer uniform en heeft een zeer goede wortelproductie. Galaxie vraagt ruim 170 groeidagen zodat de pen voldoende reserves kan opbouwen.

Geschikt voor mini-witlof

Galaxie is een uniform ras voor de late trek. De kroppen zijn buikig en het blad loopt goed door tot bovenin. Het buitenblad valt er makkelijk af waardoor de snelheid van oogsten toeneemt. In de trekkerij is Galaxie eenvoudig stuurbaar en is een wat hogere trektemperatuur wenselijk. De krop blijft daarbij vast en de pit kort. De kroppen zijn al snel gesloten zodat dit ras ook zeer geschikt is voor de teelt van mini-witlof met een oogst vanaf 14 trekdagen.

TREKPERIODE	MRT/APR	MEI t/m OKT
Zaaiperiode *	15-25 mei	20 mei - 5 juni
Hoeveelheid zaden/ha	280-300.000	290-310.000
Optimum aantal planten/ha	250-260.000	250-270.000
Groeidagen	170	170+
Rooiperiode	na 1 november	na 10 november
Bewaring pennen	-1 °C.	-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

VINTOR

Vintor is reeds jaren het standaard witlofras voor de late trek. Vintor vraagt stikstofrijkere bodems dan de meeste andere hybriden. Vintor wint de laatste jaren bij de akkerbouwers weer veel vertrouwen door de goede opkomst eigenschappen en zijn hoge uniformiteit van de pennen. Het ras is zeer bedrijfszeker en weinig ziektegevoelig. En de pennenproductie mag er ook zeer zeker zijn.

Bedrijfszekerheid voor einde seizoen

Vintor is al forceerbaar vanaf maart/april afhankelijk van de rijpheid van de pennen. Vanaf de eerste trekronde produceert Vintor een goed gevormde gladde en strak afgewerkte puntige krop. Kenmerkend voor Vintor is de gemakkelijke oogstbaarheid met weinig bladafval. Hierdoor valt de productie per bak altijd mee en kan er dus een hoog rendement behaald worden. De hoge betrouwbaarheid en het oogstgemak is voor velen een reden om voor dit ras te kiezen. We zien dan ook de laatste jaren weer een toename van het areaal Vintor in Nederland.

TREKPERIODE	MRT/APR	MEI t/m OKT
Zaaiperiode *	15-25 mei	20 mei - 10 juni
Hoeveelheid zaden/ha	290-310.000	300-330.000
Optimum aantal planten/ha	250-260.000	250-270.000
Groeidagen	160-170	160-170
Rooiperiode	na 25 oktober	na 10 november
Bewaring pennen	-1 °C.	-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei) omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto's afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd, noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto's, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.



ROODLOF CÉRALIE

Ceralie (H138) is een roodlof type voor het vroege seizoen. Dit ras blinkt uit door zijn goede kropvorm en sublieme kleur die al vanaf de eerste trek vroeg in het seizoen opvalt. Door zijn gunstige eigenschappen is er vaak een behoefte om de trekperiode te verlengen. Onder bepaalde voorwaarden (gunstige peninhoud, niet te grof caliber, en goede bewaring van de pennen) lukt het inmiddels, jaarinvloeden voorbehouden, om deze trekperiode soms behoorlijk op te rekken.



Subliem op kleur

Ceralie is een roodlof ras met ca 140 groeidagen voor het vroege seizoen. Roodlof Céralie kan bij vroege zaai gerooid worden vanaf begin oktober. Houd bij deze vroege rooiingen 3-4 weken koeling aan alvorens te starten met opzetten. Indien later gezaaid wordt hebben de roodlofpennen de capaciteit voor een iets langere bewaring. Rooien vindt dan plaats rond 1 november. Zorg er bij een langere bewaring voor dat de pennen snel teruggekoeld worden en onder nul bewaard worden. De trekperiode kan op deze wijze vaak opgerekt worden naar februari/maart en soms nog langer. De aanbevolen trektemperatuur voor dit ras is iets lager dan de gebruikelijke trektemperaturen voor de witlof rassen in dezelfde periode. Vermijd in de trekfase een bedompt klimaat en zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht.



TREKPERIODE	1/2 NOV - 1/2 DEC	1/2 DEC - JAN	FEB-MRT
Zaaiperiode *	mei	20 mei - 10 juni	1-15 juni
Hoeveelheid zaden/ha	250-280.000	260-290.000	270-300.000
Optimum aantal planten/ha	235-245.000	240-250.000	245-255.000
Groeidagen	140	145	150
Rooiperiode	oktober	rond 1 november	na 1 november
Bewaring pennen	0,0 °C.	0,0 / -1 °C.	-1 °C.

* De minimale etmaaltemperatuur om te zaaien bedraagt 12 °C. Vermijd nachtvorst! Bovenstaande kengetallen zijn gebaseerd op gemiddelde Nederlandse omstandigheden. Deze kengetallen dienen te worden geïnterpreteerd als trends en zijn afhankelijk van lokale omstandigheden en klimaatfactoren. De trekperiode of forceerperiode wordt uitgedrukt in "oogstmaanden van het lof".

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen in deze brochure zijn zorgvuldig samengesteld. Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Aanbevelingen en (teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfsituaties en alle lokale (groei) omstandigheden. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie in deze brochure aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De klant dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfsituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt. Alle foto's afbeeldingen en illustraties zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn niet gegarandeerd, noch bedoeld voor alle bedrijfsituaties en lokale (groei)omstandigheden. Houder van het auteursrecht op alle foto's, afbeeldingen en illustraties in deze brochure is Chicosem.